



## Влажный кашель

## Муколитические препараты

МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
Амброксол	Амброксол	Сироп	<b>Детям до 2 лет</b> – по 2,5 мл сиропа 2 раза в сутки <b>Детям от 2 до 6 лет</b> – по 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки <b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 5 мл сиропа 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – в течение первых 2-3 дней принимать по 10 мл сиропа 3 раза в сутки, затем дозу следует уменьшить до 10 мл сиропа 2 раза в сутки	0+ (до 2 лет только под контролем врача)
		Таблетки	<b>Детям от 6 до 12 лет</b> — по 15 мг (1/2 таблетки) 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – по 30 мг 3 раза в сутки в первые 2-3 суток, затем – по 30 мг 2 раза в сутки или по 15 мг (1/2 таблетки) 3 раза в сутки	От 6 лет
		Раствор для приема внутрь	<b>Детям до 2 лет</b> – по 1 мл 2 раза в сутки <b>Детям от 2 до 6 лет</b> – по 1 мл 3 раза в сутки <b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 2 мл 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – первые 2-3 дня по 4 мл 3 раза в сутки, затем по 4 мл 2 раза в сутки	0+ (до 2 лет только под контролем врача)
	Амбробене	Раствор для приема внутрь и ингаляций	<b>Детям до 2 лет</b> – по 1 мл раствора 2 раза в сутки (15 мг в сутки) <b>Детям от 2 до 6 лет</b> – по 1 мл раствора 3 раза в сутки (22,5 мг в сутки) <b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 2 мл раствора 2-3 раза в сутки (30-45 мг в сутки) <b>Взрослым и подросткам старше 12 лет</b> – в первые 2-3 дня по 4 мл раствора 3 раза в сутки (90 мг в сутки). В последующие дни – по 4 мл 2 раза в сутки (60 мг в сутки)	0+



#фармедицино



МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
		Таблетки	<b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 1/2 таблетки 2-3 раза в сутки (15 мг амброксола 2-3 раза в сутки) <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – в первые 2-3 дня лечения по 1 таблетке 3 раза в сутки (30 мг амброксола 3 раза в сутки)	От 6 лет
	Лазолван	Раствор для приема внутрь и ингаляций	<b>Прием внутрь (1 мл=25 капель)</b> <b>Детям до 2 лет</b> – 1 мл 2 раза в сутки <b>Детям от 2 до 6 лет</b> – 1 мл 3 раза в сутки <b>Детям от 6 до 12 лет</b> – 2 мл 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – 4 мл 3 раза в сутки  <b>Ингаляции</b> <b>Детям до 6 лет</b> – 1-2 ингаляции по 2 мл раствора в сутки <b>Взрослым и детям старше 6 лет</b> – 1-2 ингаляции по 2-3 мл раствора в сутки	0+
		Сироп	<b>Детям до 2 лет</b> – 2,5 мл 2 раза в сутки <b>Детям от 2 до 6 лет</b> – 2,5 мл 3 раза в сутки <b>Детям от 6 до 12 лет</b> – 5 мл 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – 10 мл 3 раза в сутки	0+
		Пастилки	<b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 1 пастилке 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – по 2 пастилки 3 раза в сутки	От 6 лет
		Таблетки	<b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 15 мг (1/2 таблетки) 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – по 30 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки	От 6 лет
		Капсулы пролонгированного действия	<b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 15 мг (1/2 таблетки) 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> – по 30 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки	Старше 12 лет



#фармедицино



МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
	Халиксол®	Сироп	<b>Детям до 2 лет</b> – 2,5 мл сиропа 2 раза в сутки <b>Детям от 2 до 5 лет</b> – 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки <b>Детям от 6 до 12 лет</b> – по 5 мл сиропа 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> в первые 2-3 дня лечения – по 10 мл сиропа 3 раза в сутки, а в следующие дни – по 10 мл сиропа 2 раза в сутки или по 5 мл сиропа 3 раза в сутки	0+ (до 2 лет только под контролем врача)
		Таблетки	<b>Детям в возрасте до 5 лет рекомендуют принимать Халиксол® сироп.</b> <b>Детям от 5 до 12 лет</b> - по 1/2 таблетки 2-3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> - в первые 2-3 дня лечения: по 1 таблетке 3 раза в сутки, в следующие дни – по 1 таблетке 2 раза или по 1/2 таблетке 3 раза в сутки	От 5 лет
	Флавамед®	Раствор для приема внутрь	<b>Детям до 2 лет</b> – 2 раза в сутки по 1/2 мерной ложки (2,5 мл) раствора <b>Детям от 2 до 6 лет</b> препарат назначают только в виде раствора 3 раза/сут по 1/2 мерной ложки (2,5 мл) <b>Детям от 6 до 12 лет</b> – 2-3 раза в сутки по 15 мг (1/2 таблетки или 1 мерной ложке раствора) <b>Взрослым и детям старше 12 лет</b> в течение первых 2-3 дней – 3 раза в сутки по 30 мг (1 таблетка или 2 мерных ложки (10 мл) раствора, затем – 2 раза в сутки по 30 мг (1 таблетка или 2 мерные ложки)	0+
		Таблетки		От 6 лет
Ацетилцистеин	АЦЦ®	Раствор для приема внутрь	<b>Детям от 2 до 5 лет</b> – по 5 мл раствора 2-3 раза в сутки (эквивалентно 200-300 мг ацетилцистеина в сутки) <b>Детям и подросткам в возрасте от 6 до 14 лет</b> – по 10 мл раствора 2 раза в день (эквивалентно 400 мг ацетилцистеина в сутки). <b>Взрослым и подросткам в возрасте от 14 лет</b> – по 10 мл раствора 3 раза в сутки (эквивалентно 600 мг ацетилцистеина в сутки)	От 2 лет



#фармедицино



МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
		Порошок для приема внутрь	<b>Детям от 2 до 6 лет</b> – по 1 пакету АЦЦ® 100 мг или 1/2 пакетика АЦЦ® 200 мг 2-3 раза в сутки (200-300 мг в сутки) <b>Детям от 6 до 14 лет</b> – 1 пакетик 3 раза в сутки или 2 пакетика 2 раза в сутки АЦЦ® 100 мг (300-400 мг в сутки) АЦЦ® 200 мг следует принимать 3 раза в сутки по 1/2 пакетика или 2 раза в сутки по 1 пакету (300-400 мг в сутки) <b>Взрослым и подросткам старше 14 лет</b> – по 2 пакетика АЦЦ® 100 мг или по 1 пакету АЦЦ® 200 мг 2-3 раза в сутки (400-600 мг в день)	От 2 лет
	Флуимуцил®	Раствор для приема внутрь	<b>Детям от 2 до 5 лет</b> – 5 мл раствора для приема внутрь 20 мг/мл в 2-3 приема (соответствует 200-300 мг ацетилцистеина в сутки) <b>Детям и подросткам от 6 до 14 лет</b> – 5 мл раствора для приема внутрь 20 мг/мл в 3-4 приема (соответствует 300-400 мг ацетилцистеина в сутки) или 5 мл раствора для приема внутрь 40 мг/мл в 2 приема (соответствует 400 мг ацетилцистеина в сутки) <b>Детям старше 14 лет</b> – 5 мл раствора для приема внутрь 40 мг/мл в 1-3 приема (соответствует 200-600 мг ацетилцистеина в сутки) <b>Взрослым</b> – 5 мл раствора для приема внутрь 40 мг/мл в 1-3 приема (соответствует 200 - 600 мг ацетилцистеина в сутки)	От 2 лет
		Раствор для внутривенного введения и ингаляций	<b>В/в или в/м взрослым</b> – по 300 мг 1-2 раза в сутки <b>Детям от 6 до 14 лет</b> – по 150 мг 1-2 раза в сутки	От 6 лет



#фармедицино



МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
		Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь	<b>Новорожденным</b> – только по жизненным показаниям в дозе 10 мг/кг под строгим контролем врача <b>Детям от 1 года до 2 лет</b> – по 100 мг 2 раза в сутки <b>Детям от 2 до 6 лет</b> – по 200 мг 2 раза в сутки или по 100 мг 3 раза в сутки <b>Взрослым и детям старше 6 лет</b> – по 200 мг 2–3 раза в сутки	0+
		Таблетки шипучие	<b>Взрослым</b> – по 600 мг (1 таблетки) 1 раз в сутки	От 18 лет
	ЭСПА-НАЦ®	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	<b>Дозировка 200 мг</b> <b>Взрослым и детям старше 14 лет</b> – 2-3 раза в сутки по 1 пакету (400-600 мг) <b>Детям от 6 до 14 лет</b> – 2 раза в сутки по 1 пакету (400 мг) <b>Детям от 2 до 6 лет</b> – 2-3 раза в сутки по 1/2 пакету (200-300 мг)  <b>Дозировка 600 мг</b> <b>Взрослым и детям старше 14 лет</b> – 1 раз в день по 1 пакету (600 мг)	Дозировка 200 мг от 2 лет, 600 мг – старше 6 лет при муковисцидозе, остальные показания старше 14 лет
	Мукоцил Солюшн Таблетс®	Таблетки диспергируемые	<b>Детям от 2 до 6 лет</b> – 100 мг (в перерасчете на необходимое количество таблеток диспергируемых) 2-3 раза в сутки (соответствует 200-300 мг ацетилцистеина в сутки) <b>Детям от 6 до 14 лет</b> – 100 мг (в перерасчете на необходимое количество таблеток диспергируемых) 3-4 раза в сутки или 200 мг (в перерасчете на необходимое количество таблеток диспергируемых) 2 раза в сутки (соответствует 300-400 мг ацетилцистеина в сутки) <b>Детям старше 14 лет</b> – 300 мг (в перерасчете на необходимое количество таблеток диспергируемых) 2 раза в сутки или 200 мг (в перерасчете на необходимое количество таблеток диспергируемых) 2-3 раза в сутки (соответствует 400-600 мг ацетилцистеина в сутки)	От 2 лет



#фармедицино



МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
	Ацетилцистеин Канон	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь	<b>Детям от 2 до 6 лет</b> – по 1 пакету 100 мг 2–3 раза в сутки (200-300 мг в сутки) <b>Детям от 6 до 14 лет</b> – по 1 пакету 3 раза в сутки или по 2 пакетика 2 раза в сутки препарата Ацетилцистеин Канон 100 мг (300–400 мг в день). Препарат Ацетилцистеин Канон 200 мг следует принимать по 1/2 пакетика 3 раза в сутки или по 1 пакету 2 раза в сутки (300–400 мг в день) <b>Взрослым и подросткам старше 14 лет</b> – по 2 пакетика 100 мг или по 1 пакету 200 мг 2–3 раза в сутки (400–600 мг в сутки)	Дозировка 100 мг – с 2 лет Дозировка 200 мг – с 6 лет Дозировка 600 мг – старше 14 лет
	Эйфа® АЦ	Гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь	<b>Детям от 6 до 14 лет</b> – по 1/2 пакета -саше 3 раза в сутки или по 1 пакету-саше 2 раза в сутки (300-400 мг в сутки) <b>Взрослым и подросткам старше 14 лет</b> – по 1 пакету-саше 2-3 раза в сутки (400-600 мг в сутки)	Старше 6 лет
Бромгексин	Бромгексин	Раствор для приема внутрь	<b>Детям от 3 до 6 лет</b> – по 5 мл 3 раза в сутки (12 мг бромгексина в сутки) <b>Детям от 6 до 14 лет и пациентам с массой тела 50 кг</b> – по 10 мл 3 раза в сутки (24 мг бромгексина в сутки) <b>Детям старше 14 лет и взрослые</b> – по 10-20 мл 3-4 раза в сутки (24-48 мг бромгексина в сутки)	От 3 лет
		Капли для приема внутрь	<b>Детям от 12 до 14 лет и пациентам с массой тела 50 кг</b> – 23 капли <b>Взрослым и детям старше 14 лет</b> – 23-46 капель	От 12 лет
		Таблетки	<b>Детям от 3 до 6 лет</b> – 4 мг (1/2 таблетки) 3 раза в сутки <b>Детям от 6 до 14 лет</b> – 8 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки <b>Детям старше 14 лет и взрослые</b> – 8-16 мг (1-2 таблетки) 3-4 раза в сутки	От 3 лет



#фармедицино



МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
Карбоцистеин	Флуифорт	Сироп	<b>Детям от 1 года до 5 лет</b> – 2,5 мл сиропа (225 мг) – 2-3 раза в сутки <b>Детям старше 5 лет</b> – 5 мл сиропа (450 мг) – 2-3 раза в сутки <b>Взрослым</b> – 15 мл сиропа (1,35 г) – 2-3 раза в сутки	От 1 года
		Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь	<b>Взрослым</b> – по 1 пакету в сутки	Старше 18 лет
	Флюдитек	Сироп для детей 20 мг/мл 125 мл	<b>Новорожденным и детям от 1 месяца до 2 лет</b> – 20-30 мг/кг/сутки в 1 или 2 приема, при этом не следует превышать дозу 100 мг в сутки <b>Детям от 2 до 5 лет</b> – по 200 мг в сутки, т.е. по 1 чайной ложке 2 раза в сутки <b>Для детей старше 5 лет суточная доза</b> – 300 мг, т.е. по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки	0+
		Сироп 50 мг/мл 125 мл	<b>Взрослым</b> – по 15 мл 3 раза в сутки	От 18 лет
		Раствор для приема внутрь	<b>Взрослым и детям старше 15 лет</b> – по 750 мг (1 саше) 3 раза в сутки	Старше 15 лет
	Цитобронхо	Сироп	<b>Детям от 2 до 5 лет</b> – по 5 мл 2 раза в сутки (200 мг в сутки) <b>Детям от 5 до 15 лет</b> – по 5 мл 3 раза в сутки (300 мг в сутки)	От 2 лет
	Касцебене	Капсулы	<b>Взрослым и подросткам старше 15 лет</b> – по 750 мг (2 капсулы) 3 раза в сутки	Старше 15 лет
	Карбоцистеин	Сироп 20мг/мл	<b>Детям от 2 до 5 лет</b> – по 1 чайной ложке сиропа 2 раза в сутки <b>Детям старше 5 лет</b> – по 1 чайной ложке 3 раза в сутки	От 2 лет
Сироп 50мг/мл		<b>Взрослым</b> – по 1 столовой ложке 3 раза в сутки	От 18 лет	



#фармедицино



МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Дозировка	Возрастные ограничения
	Бронхобос®	Капсулы	<b>Взрослым и подросткам старше 15 лет</b> – по 750 мг (2 капсулы) 3 раза в сутки	Старше 15 лет
		Сироп	<b>Детям от 3 до 6 лет</b> – по 5 мл (1 мерная ложечка) 2,5% сиропа 2-4 раза в сутки <b>Детям старше 6 лет</b> – по 5-10 мл (1-2 мерных ложечки) 2,5% сиропа 3 раза в сутки <b>Взрослым</b> – по 15 мл (3 мерных ложки) 5% сиропа 3 раза в сутки	От 3 лет
	Либексин Муко®	Сироп 20 мг/мл	<b>Детям от 2 до 5 лет</b> – 1 мерная ложка (5 мл) 2 раза в сутки (200 мг в сутки) <b>Детям старше 5 лет</b> – 1 мерная ложка (5 мл) 3 раза в сутки (300 мг в сутки)	От 2 лет
		Сироп 50мг/мл	<b>Взрослым и подросткам старше 15 лет</b> – по 1 мерному стаканчику (15 мл) 3 раза в сутки	Старше 15 лет